


卷十

吉慶堂



關中

西陵

○漢書

郭橐駝曰凡種樹者必知時節曰產後傷風也寒暑
若未滿月飲冷傷風氣滯於胃腸故腹痛作雖
如錐刀所刺流火大腸水穀不化潤腸鳴或下赤白膿血
或痛走不定急服調中湯其愈若醫者以爲難治者
薛之謙之

陳無難評曰產後下痢非止一證皆由血虛血熱
因血所不寧然風氣不和外因亦多矣

BGA 2936

U.8

濟陰綱目卷之十四

關中

武之望叔卿父著輯

武林

薛

芳汝楫父訂正

西陵

汪淇瞻漪子箋評

天都

查

望千周父叅閱

○泄瀉

郭稽中曰。產後腹痛及泄利者。何答曰。產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛襲留於育膜。散於腹脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞瀉腸鳴。或下赤白。眩脇臍脹。或痛走不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯取之。禍不旋踵。謹之謹之。

陳無擇評曰。產後下痢。非止一證。當隨所因而調之。旣云飲冷當風。何所不至。寒熱風濕。本屬外。因喜怒憂思。還從內性。况勞役饑

飽皆能致病。若其洞泄，可服調中湯。赤白帶下，非此能愈。各隨門類，別有三方。

此十一法，須體酌純熱，然只用八方。加減可未要而約矣。而八方之中，以六君子加味者五，補中益氣者一，而益黃四神八味腎氣等藥，或兼或肝，其切減當於此得心。其他亦可變通矣。又何患方之不廣，用之不神歟。

薛氏曰：產後瀉痢，或因飲食傷損脾土，或脾土虛不能消食，當審而治之。若米食所傷，用六君子加穀蘗。若麪食所傷，用六君子加麥蘗。若肉食所傷，用六君子加山楂神麴丸。兼嘔吐，皆加藿香。若兼噤酸或嘔吐，用前藥送越鞠丸。若肝木來侮脾土，用六君子加柴胡、芍藥。若寒水反來侮土，用錢氏益黃散。若久瀉，或元氣下陷，兼補中益氣湯，以升發陽氣。若瀉痢色黃，乃脾土真氣，宜加木香、肉果。若脾土虛寒，當用六君子加木香、薑桂。若脾腎虛寒，用補中益氣及四神丸。若屬命門火衰，而脾土虛寒，用八味丸以補土母。若小便澀滯，肢體漸腫，或兼喘咳，用金匱腎氣丸以補脾腎利水道。若腎

按總方所氣虛弱而四肢浮腫，治須補腎為去。若久而不愈，或非飲食所傷，言脾氣虛。

按總方所
言脾氣虛
寒用

氣虛弱而四肢浮腫。治須補胃為主。若久而不愈。或非飲食所傷而致。乃屬腎氣虧損。蓋胞胎主於肝。而繫於腎。况九月十月。乃腎與膀胱所養。必用四神六味八味三藥。以補腎。若用分利導水之劑。是虛其虛也。

一產婦瀉痢發熱作渴。吐痰甚多。肌體消瘦。飲食少思。或胸膈痞滿。或小腹脹墜。年餘矣。余以爲脾胃瀉。朝用二神丸。夕用六君干。三月餘而痊。

一婦產後泄瀉。兼嘔吐。噯酸。面目浮腫。此脾氣虛寒。先用六君干。炮薑爲主。佐以越鞠丸。而噯酸愈。又用補中益氣。加茯苓半夏。而脾胃康。

一產婦泄瀉年餘。形體骨立。內熱晡熱。自汗盜汗。口舌糜爛。口吐

六君加木香
薑桂而此止
加炮薑一味
為主是又不
必拘於一定
之法矣

痰三碗許。脈洪大重。按全無。此命門火衰。脾土虛寒。而假熱也。吐
痰者。乃脾虛不能統攝歸源也。用八味丸補火以生土。用補中益
氣湯兼補肺金而脾胃健。

此法據前條
止用補中四

一產婦腹痛後重。去痢無度。形體倦怠。飲食不進。與死為鄰。此脾
腎俱虛。用四神丸十全大補湯而愈。但飲食難化。肢體倦怠。用補
中益氣而康。

神而此又加
一十全大補

一婦人五月患痢。日夜無度。小腹墜痛。發熱惡寒。用六君子湯送

可見須因症
用藥毋執泥

香連丸二服漸愈。仍以前湯送四神丸四服全愈。至七月終。怠惰

此症若只擬
前法而用六

嗜臥四肢不收。體重節痛。口舌乾燥。飲食無味。大便不實。小便頻

升陽益胃使

升陽益胃湯而痊。

此法據前條止用補中四神而此又加一十全大補可見須因症用藥毋執泥此症若只擬前法而用六君補中不用升陽益胃使

非范法故知
立言之中有
不言之妙所
謂言不盡意
也
丹溪云泄瀉
症最惡一切
湯飲石山亦
然所謂理無
二致也

汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時即泄下如此半月餘
眾皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪診之脉皆濡緩而弱曰
此產中勞力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以參
苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗調服旬餘而安

調中湯治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛泄瀉不止

良薑

當歸酒浸

肉桂火

不見白芍炒

川芎

附子

炮去皮尖各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右呷咀每服三錢水煎服

荳蔻理中丸

治產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治男子

脾胃虛弱久泄不止

人參

一兩

白朮

二兩

乾薑

炮

甘草

炙各五錢

肉豆蔻

麝裏煨七錢

此收澁之劑
陳皮與粟殼
相等得處方
之妙

右爲細末。煉蜜丸。如桐子大。每服四五十丸。空心米飲下。酒者
麪糊丸亦可。

神効參香散。治產後脾胃虛寒。泄瀉洞下。及痢疾日久。穢積已
盡。滑瀉不止。此收澁如神。

人參

木香

各二錢

肉豆蔻

煨

白茯苓

白扁豆

各四錢

陳皮

罌粟殼

去帶襁醋炙各一兩

右爲細末。每服一錢七。清米飲調下。食遠服。

萬歷己亥。余官金陵。內人十二月產。難經宿。始娩。越旬日。洞瀉
點水入口。卽下。內人悲懼大哭。自謂必死。余偶有此藥。用一錢
以米飲調服。纔下。卽瀉。卽止。眞起死迴生之藥也。

○痢疾

大全云。產後痢疾者。由產勞傷。臟腑不足。日月未滿。虛乏未復。或

痢赤爲熱。青
之爲寒。此古
勞動太早。或誤食生冷。若行起太早。則外傷風冷。乘虛入於腸胃。胃
胃與食生。人則難化之物。傷於脾。脾氣不健。則水瀉。水瀉。則痢。此
胃氣不健。則水瀉。水瀉。則痢。此

大全云。產後痢疾皆由產後血傷。藏腑不足。日月未滿。虛乏未復。或

痢赤為熱。青之為寒。此古人之論。自河間論出。不分五色。物以為熱。豈古今不同歟。大槩始於傷冷。久變為熱。故執者多而寒者少。不可執以無寒也。必因症求之。為當。

勞動太早。或誤食生冷。若行起太早。則外傷風冷。乘虛入於腸胃。若誤食生冷。則難化之物。傷於脾胃。皆令洞泄水瀉。甚者變為痢也。若血滲入大腸。則為血痢。難治。世謂之產子痢也。得冷則白。或如魚腦。得熱則赤黃。或為驟血。若冷熱相搏。則下痢赤白。或膿血相雜。若下痢青色。則極冷也。若飲食不進。便利無常。日夜無度。產後本虛。更加久痢不止。無力瘵之。愈見羸弱。謂之虛羸下痢。又有產後氣血不順。而下痢赤白。謂之氣痢。治之之法。熱則涼之。冷則溫之。冷熱相搏。則調之。滑者澀之。虛羸者神之。水穀不分者。當利小便。若產婦情性執着。不能寬解。須當順其氣。未有不妥者也。薛氏曰。前證白屬氣分。而赤屬血分也。其論詳見瀉利。

一產婦食雞子。腹中作痛。面色青黃。服平胃二陳。更下痢。腹脹。服

若果脉大無

力可不溫補

而乃用黃芩

為藥湯者以

纏墜極痛之

症為積滯未

去也故從症

不從脉焉

凡理氣虛不

能致津液以

着臍腑而渴

者宜一味白

朮煎湯代茶

庶無水腫之

患

理尋愈

流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木剋侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血

纏墜極痛其脉大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安

產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥

故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流

溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自瘥

薛氏曰痢證若渴而不喜飲食屬胃氣虛不能生津液宜用七味

白朮者夜間發熱口渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以

益氣湯以滋化源

此以四物湯
去川芎加艾
膠所以止血
也而歸甘各
用三兩為君
所以和氣血
而止腹痛耳
妙在甘以緩
之
三方一為氣
虛一為血虛
而前方妙在
分兩此方重
在虛滑不然
參米藥穀豈
常哉之味
白頭翁湯原
仲景治協熱
毒痢藥而脈
經加膠甘以

救急散。治產後赤白痢。腹中絞痛。

白芍 阿膠 艾葉 熟地黃各一 當歸

甘草各三兩

右吹咀。水煎分二服。空心飲。

加味四君子湯。治產後赤白痢神効。

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 黃耆各一錢

罌粟殼炙去蒂五分

右剉水煎。

以上三方治虛滑

白頭翁加甘草阿膠湯。治產後下痢虛極。脈經作熱痢重。下新產虛極者。

白頭翁 甘草炙 阿膠炒各二兩 黃連 黃蘗

治熱產極虛
然非熱刺下
血其敢用乎

前以四君栗
壳治氣虛而
滑此以四物
栗壳以治血
執虛滑氣血
之分智者自
辨而止澁之
劑非滑勿投
慎之

此方以三黃

解毒為主非

真熱勿用辨

之

秦皮

去皮各
三錢

右剉作二服水煎納膠合消盡溫服

槐連四物湯

治產後熱滑血痢臍腹疼痛

當歸

川芎

赤芍藥炒

生地黄

槐花炒

黃連

炒各一錢
御米殼去蒂蜜炙五分

右剉水煎服

黃連丸

治產後熱滑赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連

兩

黃芩

黃檗各一兩

梔子仁

阿膠

蒲黃

各一兩
當歸二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲下日三夜一

以上三方治熱滑

以下此症字
字真切不
一空用此方
者須知集方
之心所謂無
妄之藥勿試
也
以血瀉而用
姜桂人所難
信而謂寒滑
不禁又所當
遭夫學道愛
人用方者宜
休認之
此方以神仙
感應為名必
非虛語然以
為食葷早而
致泄者脾胃
必薄故用參

神効參香散。治痢疾日久穢積已少腹中不痛或微痛不寢
滑溜不止乃收功之後棄也。

方見前泄瀉。

一方。治產後血瀉不禁餘血作痛兼塊屬寒滑者。

桂心

乾薑各等分

右為末空心酒調服方寸七。

以上三方治寒滑。

神仙感應丸。產後固無積痢多有因食葷味早亦作瀉痢者百
無一生非此方不能救之三二服立止不然荏苒日月致不救
也。如不因食葷者不可服。

神効參

人參

只沒麵炒去穢
枳殼各一錢

赤石脂

熟地

木而神變為

化食之用枳

壳佐之赤石

脂固之似矣

而熟地何為

也大抵腎者

胃之閱產後

腎虛氣不能

固故用之歟

於食軍不食

薑可服不可

服之理自非

庸人所知

凡治積方不

等而此所集

方一用地黃

石脂此用連

翹好墨亦大

異也其他不

過溫氣行氣

白朮各二錢

右為細末每服三錢空心米飲調下

連翹丸治產後久病赤白痢蓋因脾胃不和氣滯積聚所致心

腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛危困者

連翹 陳皮白 京三稜各錢半 肉桂不見火 檳榔

牽牛子取頭末 蓬朮 青皮去白各一錢 肉荳蔻麩裏煨 好墨各半兩

右為細末麩糊丸如桐子大每服三十丸米飲下或用水煎服

亦可

以上三方治積痢

三聖散治產後下血痢不止

烏魚骨 燒綿灰 血餘灰汗脂者各等分

於何方可再

治產後痢月五十行者

有人用何藥
於何方可再
求之

右為細末每服一錢前石榴皮湯調下熱服

一方治產後痢日五十行者

取水裏蠶糞炒黃急以水沃之令稀調得所服之即愈

治產後諸痢雜方

取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

一方煮薤白食之

一方羊腎脂炒薤白空心食之

一方敗龜板一枚米醋炙研為末醋湯調下

治產後血痢雜方

一方用阿膠二兩以酒一升半煮一升頓服

一方用生馬齒莧搗汁二大合煮一沸下蜜二合調頓服

以上雜治方

必効方。療產後痢而渴飲無度數。

清心生津

麥門冬三兩

烏梅二十箇

右細剉水一升煮取七合細呷。

經効方。療產後久痢津液涸渴不止。

瀉氣生津

龍骨十二分

厚朴

茯苓

黃耆

麥門冬

人參各八分

生薑六分

大棗十四枚

右細剉以水一大斗煮取七合空心分兩服。

錄驗方

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥。

冬瓜一枚黃泥糊厚五寸煨爛熟去皮絞汁服之痊。

為消渴所宜故服之

七味白朮散

治產後痢津液竭渴不止。

以上治痢疾發渴

大和胃以生津

方見前渴

以上治痢疾發渴

○大便秘澁

郭稽中曰。產後大便秘澁者。何。答曰。產後水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便秘澁不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此乃燥屎在臍。臍以其乾澁。未能出耳。宜服麻仁丸。以津潤之。若誤以爲有熱。投之寒藥。則陽消陰長。變證百出。性命危矣。

薛氏曰。前證因去血過多。大腸乾涸。不可計其日期。飲食數多。而用藥通之。必待腹滿覺脹。欲去不能者。乃結在直腸。宜用猪膽汁潤之。若服苦寒疎通之劑。反傷中氣。或愈加難通。或通而不止。或成痞證也。若去血過多者。用十全大補湯。若血虛火燥者。用加味

四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則誤矣。

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安。

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起。

一產婦大便秘結小腹胀痛用大黃等藥致吐瀉不食腹痛胸痞。

婦人大便秘結諸藥不應苦不可言令飲人乳而安。

一產婦大便秘結。小腹脹痛。用大黃等分。煎。飲。吐。胃。不。食。及。通。國。法。

余用六君子加木香炮薑治之而愈。

一婦人大便秘澁。諸藥不應。苦不可言。令飲人乳而安。

李氏曰。產後大便秘者。芎歸湯加防風枳殼甘草。秘澁者。麻子仁

丸。或蘇麻粥。蓋產後去血多。則鬱胃。鬱胃則汗多。汗多則大便閉。

皆血虛也。

調導散。治婦人產前產後大便不通。

當歸 川芎 防風 枳殼各四錢 甘草炙二錢

右咬咀。每服一兩。用生薑三片。棗一枚。水煎溫服。忌動風物。

麻仁丸。治產後去血過多。津液枯竭。不能轉送。大便閉澁。

大麻仁研如泥 枳殼麩炒 人參各一兩 大黃半兩

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒米飲任下。未

用防風薑
欲降之。先
升之也。

亦是良法

通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利利者百無一生去血過多臟燥大便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為丸復以臘茶下之必通

產後固不可輕用大黃然大腸秘結不通或惡露點滴不出不得大黃以宣利之勢必不通但利後即當以參耆白木甘草及芎歸等藥大劑調補之不然元氣下脫後將不可救矣

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁

去皮麪炒

桃仁

如上製各一兩

栢子仁

五錢

松子仁

一錢半

郁李仁

一錢麪炒

橘紅

四兩為末

一方加當歸稍五錢

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如桐子大每服

以橘紅為君者利氣潤下也

三十九丸加至五十六丸食前清米飲下

一、九加當歸、稀五錢

三十丸。加至五六十丸。食前清米飲下。

阿膠枳殼丸。治產後大便秘澁。

二、尿有見

阿膠

枳殼各等分

右為末。煉蜜丸。如桐子大。滑石末為衣。溫水下二十丸。未通再服。

麻蘇粥。婦人產後有三種疾。鬱冒則多汗。汗多則大便秘。故難

以用藥。惟麻子蘇子粥最為穩當。

蘇子

大麻子

各半合洗淨

右研極細。用水再研取汁一盞。分二次煮粥啜下。

本事方云。此粥不惟產後可服。大抵老人諸虛風秘。皆宜服之。嘗有一人。年八十四。忽爾腹痛。頭疼。惡心。不食。召醫數十議。

濟陰雜目 卷一
皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不飲食其家
憂惶余辯說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚於
胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神不清也若
臟腑流暢諸疾悉去矣予命作此粥兩啜而氣泄先下結糞如
胡桃者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

兵部手集方 治產後秘結不通膨滿氣急坐卧俱難

用大麥蘖炒黃爲末酒下一合神効

用大麥自有心得

○大小便不通

大全云產後大小便不通者本腸胃挾熱因產後血水俱下津液
燥竭腸胃痞澁熱氣內結於腸胃故令大小便不通也

薛氏曰治一婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍

通氣散 治產後大小便不通

通氣

通三日而痊人乳尤善

通氣散。治產後大小便不通。

陳皮

蘇葉

枳殼炒麩

水通各等分

右剉散。每服四錢。水煎溫服立通。

桃仁散。治膀胱氣滯血澁。大小便閉。

桃仁

葵子

滑石

檳榔各等分

右爲細末。每服二錢。空心葱白湯調下。

枳殼丸。治產後天小便澁滯。

木香一錢

枳殼炒

麻仁炒

大黃各一兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服三十丸。溫水送下。食後如飲食

不化亦宜服之。

通氣涼血
腸

通血

涼大小腸血而止血者也則牡蠣之游與別藥不同

一方治產後大小便不利下血

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黃

芍藥各一兩五錢

右為細末空心米飲調服方寸匕忌麴棗

金鑰匙散治產後大小便不通腹脹等證

滑石

蒲黃各等分

右為細末酒調下二錢

○遺尿

夫腎開竅於二陰而大便者血之道腎主之故立齋集方皆以脾腎為治以命門兼之者土

薛氏曰產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主虛寒加肉苁蓉補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子散主之

惡溫也。
非大有見者。
不能主此方。

以下二方乃
自良所集各
取其義也。

一產婦大便不實。飲食少思。五更或清晨遺尿。此中氣虛寒。脾腎
不足。用補中益氣。送四神丸而痊。

產婦小便出黃。名大小腸交。乃氣不俱虛。失行常道。先用六君
子二劑。又用五苓散一劑而痊。尋常腸交亦可用。

補遺方。療產後遺尿不知。亦治遺尿。

白欬

芍藥 各七分

右爲末。酒調服方寸匕。

集驗方。療產後遺尿。亦治男子。

桔礬

牡礬 煨各等分

右爲末。酒調服方寸匕。日三服。

加味補中益氣湯。治脾腎虛寒。大便不禁。

此加法火土相生之理然非原方所加以此推之能以此無法觀法斯為妙法

本草以肉蓯蓉善動大便人皆忌之今治遺糞而立齋反以為用立齋為一代名醫而反不知即以前所當用則不忌耳

黃耆

人參

白朮

甘草

各一錢

當歸

陳皮

各七

升麻

柴胡

各三

肉苳蔻

補骨脂

各五

右剉一劑水煎服

還少丹

治脾腎虛弱遺糞

肉蓯蓉

遠志

去心

茴香

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黃

石菖蒲

山茱萸

去核

牛膝

杜仲

去皮

楮實子

五味子

白茯苓

各三

右為末

用棗肉百枚同煉蜜丸

如桐子

每服五七十九

空心溫

酒或鹽湯下日三服

四神丸

治脾腎虛弱

大便不實

或五更作瀉

破故紙

吳茱萸

炒各

肉豆蔻

生

五味子

各一

右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩切碎同煎用木香湯下

右為末。用大紅棗四十九枚。生姜四兩。切碎。同藥用水煮熟。去
姜。取棗肉和藥丸。桐子大。每服王十九空。心鹽湯下。

五味子散。治腎泄。

五味子

二兩

吳茱萸

半兩

右炒香熟。研為細末。每服二錢。陳米飲調下。

廣濟方

治產後遺糞。亦治男子

取故燕窩中草。燒為末。以酒調下半盞。

○淋瀝

熱邪搏血。則有之。滲入胞中。則未也。如交腸症。亦豈滲入而來耶。

大全云。產後諸淋。因熱氣客於脬中。內虛則類數熱。則小便澀痛。故謂之淋。○又有因氣虛挾熱。熱邪搏血。滲入胞中。血隨小便而出。為血淋者。

五淋各治有
虛實然則冷
熱無分矣

三因論曰。治諸產前後淋泌。其法不同。產前當安胎。產後當去血。如其冷熱膏石。氣淋等。為治則一。但量其虛實而用之。瞿麥蒲黃。最是產後要藥。唯當究其所因。則不失其機要矣。

薛氏曰。按前證若膀胱虛熱。用六味丸。若陰虛而陽無以化。用滋腎丸。蓋土生金。金生水。當滋化源也。仍參淋瀝頻數。門調治。

以分利降火

之劑太過故
用此藥補之

此方甚良

一產婦小水淋瀝。或時自出。用分利降火之劑。二年不愈。余以為肺腎之氣虛。用補中益氣湯。六味地黃丸。而痊。茅根湯。治產後諸淋。無問冷熱。膏石氣結。悉主之。

白茅根

錢五

瞿麥穗

白茯苓

各二錢半

葵子

人參

各一錢二分半

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各六分

紫貝

一箇

石首魚腦砂

二箇

榮具石首皆

石淋要藥

錢木通則湯調下。如氣壅閉。木通滴皮煎湯調下。

榮具石首指
甘草 俗六
紫貝 一箇
石首 魚鱗 沙 二箇
滑石

右劉分二貼。加生薑三片。燈心二十根。水煎服。或為末。每服三錢。木通煎湯調下。如氣壅閉。木通橘皮煎湯調下。

滑石散。治產後熱淋。

滑石 一兩二錢半研 通草 車前子 葵子 各兩

右為末。以漿水調服。方寸七。至二七為妙。

滑石通淋散。產後小便緊澁不通者。因血熱積於小腸。經水不利。恣食熱毒之物。而成淋澁故也。

赤茯苓 澤瀉 木通 黃連 豬苓 各八分

白朮 瞿麥 山梔子 車前子 各等分 滑石 四分

右劉加燈心十二莖。水煎。空心熱服。

石韋散。治婦人小便卒淋澁。

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子

瞿麥穗 甘草各等分

右吹咀每服八錢加生姜三片水煎食前溫服

加味四物湯 諸淋皆屬於熱用此累効

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 甘草稍

杜牛膝 木通各一錢 桃仁去皮尖五箇 滑石一錢半 木香

右剉水煎服

一方療產後淋小便痛及血淋

百茅根五分 瞿麥 車前子各一兩 鯉魚齒一百根為去

通草三分 冬葵子三分

右以水三升煮取一升入魚齒末空心服

肝主之脈皮 張氏方 療產後小便不通淋瀝 東坡一兩七白為末 杏仁溫酒調下二錢 一服更進

小腸氣道也
肝主之陳皮
杏仁皆利氣
藥故有驗

積冷者用此
所謂氣化則
能出矣

張氏方。瘵產後小便不通淋悶。

陳皮一兩去白爲末。空心溫酒調下二錢。一服便通。

瘵卒不得小便方。

杏仁十四枚。去皮尖炒爲末。和飲頓服。

炙臍法。治產後小便不通。腹脹如鼓。悶亂不醒。蓋緣未產之前。內積冷氣。遂致產時。尿胞運動不順。

用鹽填臍中。却以葱白。剝去麤皮十餘根。作一縛。切一指厚。安鹽上用大艾炷滿葱餅上。以火炙之。覺熱氣入腹內。卽時便通神驗。

○小便數。

大全云。夫產後小便數者。乃氣虛不能制故也。

薛氏曰。前證若因隱痰不愼。以致胞損。而小便淋瀝者。用八珍湯。以補氣血。若因膀胱氣虛。而小便頻數。當補脾肺。若膀胱陰虛。而小便淋瀝者。須補脾腎。

一產婦。小便頻數。時忽寒戰。乃屬脾肺虛弱。用補中益氣。加山菜。山藥為主。佐以桑螵蛸散。而愈。後患發熱。肺熱盜汗。自汗。月水不調。用加味道遙散而安。

一產婦。患前證。吐痰發熱。日晡作渴。此膀胱陰虛。用補中益氣湯。及六味丸。而愈。又患痢後。小便頻數。手足俱冷。屬陽氣虛寒。用前湯及八味丸而瘳。

桑螵蛸散。治產後陽氣虛弱。小便頻數。及遺尿。

桑螵蛸

三十箇少

鹿茸

酥炙

黃耆

各三兩

牡蠣

煨

人參

治氣虛。遺尿。骨尿。

右爲末。每服二錢。空心調下。

此治虛熱

此治虛熱

此命門藥也
專主縮小便
虛寒者宜之

厚朴

赤石脂

各二兩

右為末。每服二錢。空心粥飲調下。

外臺方。無厚朴。石脂。有甘草。生姜。

栝蒌湯。療產後小便數兼渴。

栝蒌根

人參

各三兩

黃連

桑螵蛸

甘草

炙

大棗

五十枚

右細切。用水七升。煮二升半。分三服。忌猪肉冷水。

補遺方。療產後小便數及遺尿。

益智仁為末。米飲調服。

○小便不禁

陳氏曰。婦人產後產理不順。致傷膀胱。遺尿無時。

妙在有破血之藥

丹溪云。嘗見收生者不謹。損破產婦尿脬。致病淋瀝。遂成廢疾。一
日有徐婦。年壯難產。得此因思。肌肉破傷。在外者宜用補血。胞雖
在腹。恐亦可治。遂診其脉。虛甚。予曰。難產之由。多是氣虛。產後血
氣尤虛。試與峻補。因以參耆爲君。芎歸爲臣。桃仁陳皮黃耆茯苓
爲佐。煎以猪羊胞中湯。極饑時飲之。但劑小。率用一兩。至一月而
安。蓋令氣血驟長。其胞自完。恐稍緩亦難成功矣。
薛氏曰。前證若脾肺陽虛。用補中益氣湯。加益智。若肝腎陰虛。用
六味地黃丸。若肝腎之氣虛寒。用八味地黃丸。
一產婦。小便不禁。二年不愈。面色或青赤。或黃白。此肝脾氣虛。血
熱。用加味逍遙散爲主。漸愈。佐以六味地黃丸。而痊。後因怒。小便
白遺。大便不實。左目頓緊。面色頓赤。仍用前散。佐以六君子湯。以

以下七方悉有至理放之本草乃見方不虛立集次有條醒心會意者當自得之

清肝火。生肝血。培脾土。而痊。

千金方。治產後小便不禁。

白薇

芍藥各等分

右為末。溫酒調下。方寸七日三服。

又方。治產後小便不禁。

桑螵蛸半兩炙

龍骨一兩

右為末。每服二錢。粥飯調下。

雞內金散。治產後溺淋失禁。

用雄雞胗一具。並腸洗。燒為末。溫酒調服。方寸七。

廣濟方。療產後小便不禁。

用雞尾毛。燒灰存性。酒調下一錢。七日三服。

黃耆當歸湯。婦人產後尿不禁。面微淨。略發熱。於午後。此膀胱

為坐婆所傷。

歸尾破血

黃耆

歸身尾

芍藥

白朮

人參

陳皮

甘草

分各五

錢半

右水煎熱服之

固脬散。治婦人臨產時傷手脬破小便不禁。

黃絲絹

自然黃者染黃者不用取三尺以炭灰汁煮極爛以絹水洗去灰令淨

黃蠟半兩

蜜一兩

白茅根

馬尾勃

為末各二錢

右用水二升再煎至二盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲

如作聲無効

補脬飲。治產後傷動脬破終日不小便但淋瀝不乾

生熟絹

黃色者一尺

白牡丹根皮

白芨

各一錢

右用水一碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無効

丹皮破血白芨滿飲

黃絹者爛固脬黃蠟護膜生肌茅根破血止血馬勃塞虛漏之隙

大全云產後小便出血者因氣血虛而熱乘之血得熱則流散滲

丹皮破血自

右用水一盞煎至稠關如錫服之勿作聲作聲無効

○小便出血

大全云產後小便出血者因氣血虛而熱乘之血得熱則流散滲於胞內故血隨小便出

以歸脾而愈
豈尿血亦為
脾不攝血歟
臨症須酌之

薛氏曰一產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味道遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於衆論服犀角地黃湯諸證復作仍服前湯而愈

血餘散 治產後小便出血

亂髮不拘多少湯洗淨燒灰研為末米飲調服方寸匕

滑石散 治產後小便出血

即此五方條
理有序品味
合宜孰能遺
之

滑石 研

髮灰 等分

右為末。每服一錢。生地黄汁調下。

韋氏方。療產後血滲入大小腸。

蜜一大合車前草搗汁一升

右相和煎沸分兩服。

補遺方。治產後小便出血。

川牛膝去蘆水煎服。

又方。

生地黄汁牛升生薑自然汁牛升

右相和服之。

○大便出血。

薛氏曰。產後便血。或飲食起居。或六淫七情。以致元氣虧損。陽絡

醒湯。若因怒動肝火。加味小柴胡湯。若因鬱結傷脾。加味歸脾湯。

薛氏曰。產後便血。或飲食起居。或六淫七情。以致元氣虧損。傷及
外傷。治法若因膏粱積熱。用加味清胃散。若因醇酒濕毒。葛花解
醒湯。若因怒動肝火。加味小柴胡湯。若因鬱結傷脾。加味歸脾湯。
若因思慮傷心。妙香散。若因大腸風熱。四物加側柏槐花。若因大
腸血熱。四物加芩連槐花。若因腸胃虛弱。六君加升麻柴胡。若因
腸胃虛寒。六君加肉蔻木香。若因元氣下陷。補中益氣加茯苓半
夏。若因胃氣虛弱。用六君升麻。若因血虛。用四物升麻。若因氣血
俱虛。用八珍柴胡升麻。大凡元氣虛弱而發熱者。皆內真寒而外
假熱也。但用六君子。或補中益氣。加炮姜溫補脾氣。諸證悉退。若
四肢畏冷。屬陽氣虛寒。急加附子。病因多端。當臨症制宜。庶無悞
矣。

一產婦。產後下血。諸藥不愈。飲食少思。肢體倦怠。此中氣虛弱。用

補半益氣。加吳茱萸炒黃連五分。四劑頓止。用歸脾湯治之而痊。
一婦人怒則便血。寒熱口苦。或胸脇脹痛。或小腹痞悶。此肝木乘
脾土。用六君子加山梔柴胡而愈。又用補中益氣加味逍遙二藥
而不復作。

一婦人久下血。在糞前。屬脾胃虛寒。用補中益氣湯加連炒吳茱
一錢。數劑稍効。乃加生吳茱五分。數劑而愈。

一產婦大便後血口乾。飲湯胸脇膨滿。小腹悶墜。內熱瞞熱。食少
體倦。日晡面赤。洒淅惡寒。此脾肺氣虛。先用六君加炮薑木香。漸
愈。用補中益氣將愈。用歸脾湯而愈。後因勞役兼怒。氣發熱血崩。
夜間譫語。此熱入血室。用加味小柴胡二劑而熱退。用補中益氣
而血止。用逍遙散歸脾湯調理而康。

妙理入神

加味清胃散 治因膏梁積熱便血

當歸身

酒浸一錢

黃連 生地黄

酒洗

升麻

各二錢

牡丹皮

半錢

石膏

右剉水煎服

○一方無石膏有犀角連翹甘草

的奇散 治產後惡露不行餘血滲入大腸洞瀉不禁下青黑物

亦驗

用荆芥大者四五穗於盞內燃火燒成灰不得犯油火入麝香少許研勻沸湯一兩呷調下此藥雖微能愈大病幸勿忽之

產後陰下有物脫出產腸不收

三因方云婦人趣產勞力努極致陰下脫若脫肝狀及陰下挺出

逼迫腫痛。或舉動房勞。皆能發作清水。續續小便淋瀝。

丹溪云。一婦人三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有帕尖。約重一觔。予思之。此因胎前勞乏傷氣。或肝痿所致。却喜血不甚虛耳。其時暮天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆半錢。人參一錢。白朮五分。當歸一錢半。升麻五分。三帖連服之。卽收上。得汗通身乃安。但下齋沾席處。乾者落一片。約五六兩重。蓋脂膜也。食進得眠。診其脉皆瀉。左畧弦。視其形却實。與白朮芍藥各半錢。陳皮一錢。生姜一片。煎二三帖以養之。

一婦人產子後。陰戶中下一物如合鉢狀。有二岐。其夫來求治。予思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆大料一帖與之。半日後。其夫復來曰。服二次後。覺響一聲。視之已收。陰戶訖。

破不可復生。予思之。此非腸胃乃脂膏也。肌肉破尚可復完。若氣

何以服失笑散

但因經宿乾着席上破一片如掌心大在席某妻在家哭泣恐傷破不可復生予思之此非腸胃乃脂膏也肌肉破尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加人參與一百帖三年後復有子治子宮下用黃耆一錢半人參一錢當歸七分升麻三分甘草二分作一帖水一鍾煎至五分去滓食前服却用五倍子末泡湯洗又用未傳之如此數次宜多服藥永不下

一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮姜二觔研爛入清油二觔煎油乾爲度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以前薑熏之冷則熨之六日夜縮其大半二六日卽盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣

補而升之

五倍固脫也

氣血並補而升

補血固脫

妙在一加去有本來升法

婦科

卷十四

三

當歸黃耆散

治產後陰脫謂陰戶脫下也

當歸

白芍

黃耆

人參

各二錢

升麻

五分

一方有甘草無芍藥

右剉作一劑水煎食前溫服外用五倍子泡湯洗又用未傅之

加味八珍湯

治產後生腸不收

八珍湯

八錢

黃耆

一錢

防風

升麻

各五分

右剉一服水煎服外以荊芥藿香檮皮煎湯薰洗

加味四物湯

治因產用力過多陰門突出

四物湯

四錢

龍骨

另研少許臨服入

右剉水煎服○陰痛者加藁本防風去龍骨

當歸散

治陰脫又名癰疽

若為末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重

法

當歸散 治陰脫又名續命

癰腫子宮之
脫刺蝟牡蠣
各坊涼而固
脫也

陰脫有腐肝
熱者
硫黃烏賊溫
而固脫也

溫法

當歸 黃芩各二兩 白芍一兩 蝟皮燒存性半兩 牡蠣煨二兩半

若為末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重

硫黃散 治產後努力太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼

迫腫痛舉動房勞皆能發作清水續續小便淋瀝

硫黃 烏賊魚骨各半兩 五味子二錢半

若為末摻患處日三易

烏椒湯 治陰下挺出

蜀椒一方不用此味 烏頭 白芨各半兩

右為末以方寸匕綿裹納陰中入三寸腹中熱易之一日一度

明且乃復着七日愈

寸金散 治婦人子腸下不收

醫方綱目

卷十四大更出血

三

溫
情
妙
妙

源陽別目

卷一

三

蛇牀子

韶腦

葫蘆巴

紫稍花

各等分

右爲末。每服五七錢。煎水半碗。淋洗之。三二遍爲効。

復元湯。治產後子宮不收。

荆芥穗

藿香藥

臭椿皮

各等分

右咬咀。煎湯薰沉子宮。卽入。

一方。有臨產子腸先出。產後腸不收。名曰盤腸。獻花產。

治法。命產母仰臥。却用好米醋半盞。和新汲水七合。攪勻。忽
嚥。產母面或背。每一嚥。令一縮。三嚥。三縮。腸則盡收。此良法
也。

一方。產腸出。俗用冷水嚥母面。其腸自收。此法虛弱之人。切不可用。恐驚怯成病。或卽脫絕。以此方治之。

取意

有法

取嚏之義

用草麻子四十粒。一方法去十四粒去殼研爛塗產母頭頂自能收上如收了即以水洗去頂上草麻。

又方 治腸出久而不收爲風吹乾不能收者

以磨刀水少許火上溫過以潤盤腸仍煎好磁石湯一杯與產母飲之自收。

丹溪方 產後腸不收

用香油五觔煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙。

雜方 治盤腸產

半夏爲末摘鼻中腸自上。

一方全蝎不拘多少爲末口喻水鼻內搐之立効。

一方以大紙撚蘸香油點燈吹滅以薰產母鼻中腸卽上。
雜方 治產後陰腫下脫。

鐵精羊脂二味。攪令稠布裹炙熱熨推內之。

一方用枳殼二兩去穢剉碎煎湯浸良久卽入。

一方用人尿燒酒調下方寸七。

一方腸出盛以潔淨漆器灑煎黃蓍湯浸之腸卽上。

一方蛇退蛇牀子二味炒熟布裹熨患處亦治產後陰痛。

一方單用蛇牀子一升炒熟布裹熨患處亦治產後陰痛。

一方燒兔頭未傳之。

一方以溫水洗軟却用雉屎薰燒烟熏入。

灸法 治產後陰脫灸臍下橫紋二七壯。

一法。治產後陰脫。灸臍下橫紋二七壯。

一法婦人陰挺出。四肢淫灑身悶少海主之。一作照海

一法婦人胞胎門落。癰不收常濕。灸神關玉泉五十壯身交。臍下折縱中灸

五十壯三

又法玉泉傍開三寸。灸隨年壯二

女人陰門冷腫炙飯來三十壯

○產門不開腫痛。

薛氏曰。玉門不開。氣血虛弱也。用十全大補湯。腫脹焮痛。肝經虛熱也。加味道遙散。若因憂怒。肝脾氣血傷也。加味歸脾湯。若因暴怒。肝火血傷也。龍膽瀉肝湯。

一產婦玉門不開。發熱惡寒。用十全大補。加五味子數劑。而寒熱退。用補中益氣。加五味子數劑。而玉門閉。

有二火則不
腫若非脾胃
弱則不嘔吐
故用大黃等
藥失其治也

此從飲食少
思治法

此從腸下脹
痛淋瀝治法

一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不食
外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臂諸證蜂起此真氣虛而
邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數
劑而全愈

一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗
盜汗半年矣用補中益氣湯加茯苓半夏膿水漸少飲食漸進又
用歸脾湯共五十餘劑而愈

一產婦玉門不開小便淋瀝腹內一塊攻走脇下或脹或痛用加
味逍遙散加重前子而愈

一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類猪肝面黃體倦飲食
無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍

十全大補湯

治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒

復生育

十全大補湯。治產後血氣大虛。陰門不開。發熱惡寒。

本方加五味子。水煎服。

硫黃湯。治產後玉門開而不閉。

硫黃_兩 吳茱萸 兔絲子_{各一兩半} 蛇牀子

右剉每服四錢。水一碗。煎湯頻洗之。自効。

欬陰法。治新產後陰腫下脫。及產門不合。

新石灰半升。先放在脚盆內。後以沸湯衝入。乘熱於上熏之。

俟溫用手掬清者。沃淋之。未効日再用。

當歸湯。治產後臍中風冷腫痛。

當歸 獨活 白芷 地榆_{各三兩}

敗醬_{千金翼各不用三兩}

有一婦用此法熏之。即死。不可不慎。大祇宜溫。不宜乘熱也。蓋以新石灰而加滾湯。以熏新產之婦。能不傷乎。故盡信書。不如無書。又當以已意逆之也。品味俱効。

礬石各兩

右剉碎以水一斗半煮取五升適冷暖洗陰日三

妙。適冷暖二字

謂子宮墜下以致大痛也

一方治婦人子宮大痛不可忍並產後生腸不收

五倍子

白礬各等分

右為末溫酒泡洗乾糝亦可

此子宮當以玉門為釋觀

桃仁膏治產後陰腫妨悶

桃仁去皮尖

五倍子

枯礬各等分

右為末研桃仁膏拌勻傳

一方單用桃仁去皮尖研細四五次抹之

萬應丸治產後小戶痛不可忍

知母米一去皮炒為末煉蜜丸如彈子大每服一九清酒送

此子宮當以玉門為釋觀生腸不收可想矣不然腹中之物豈能泡糝非玉門前蔡可據此謂陰腫有瘀血

兩傍屬厥陰
葱延止痛以
其通也四季
葱通而愈通
況同乳香乎
此入理之方
請試思之

化下

一。方。治產後陰戶兩傍腫痛。手足不能舒伸者。用四季葱入乳

香同搗成餅。安於陰戶兩傍。良久即愈。

○乳病

○乳汁不行

大全云。婦人乳汁乃氣血所化。其或不行者。皆由氣血虛弱。經絡
不調所致。凡乳汁勿令投於地。虫蟻食之。令乳無汁。若乳盈溢。可
潑東壁土佳。或產後乳漲。或滑作者。此年少之人。初經產乳。內有
風熱也。須服清利之藥。則乳行。若累經產。而無乳者。亡津液故也。
須服滋陰之藥。以助之。若雖有乳。却又不甚多者。須服通經之藥。
以動之。仍以姜朮引之。蓋婦人之乳。資以衝脈。衝與胃經通故也。

鍾乳原從氣
化而成故取
之以天八合
氣也微微徵
乎

以下五方皆
治盛實壅滯

有屢經產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然若婦人素有疾
在衝任乳汁少而色帶黃者生子則怯弱而多疾
三因方云產婦有二種乳脉不行有血氣盛而壅閉不行者有血
少氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土
瓜根輩虛者當用煉成鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬槩可見矣
薛氏曰前證若氣血虛弱而不能生化者宜壯脾胃怒動肝膽而
乳腫汁出者宜清肝火夫乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經
若屢產無乳或大便澁滯當滋化源
一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴余謂血氣虛以
玉露散補之而愈
通草散治產後血氣盛實乳汁不通

各有經濟法
度宜熟味之

此厥陰陽明
藥加牡蠣尤
奇

此散結通塞
劑也

桔梗

錢二

瞿麥

柴胡

天花粉

錢各

通草

七分

青皮

白芷

赤芍藥

連翹

水通

甘草

各五分

右剉一劑水煎細飲更摩乳房

漏蘆散

治婦人肥盛氣脉壅滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹

痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆

半兩

蛇退

炙十條

瓜蒌

十枚急火煨存性一方用根十枚切片炒焦

右為末每服二錢酒調下仍食猪蹄羹助之○經驗方有牡蠣

燒存性○一方只用牡蠣煨末酒調下

秘傳湧泉散○治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳乳脹

痛或作癰腫

王不留行 白丁香 漏蘆 天花粉 僵蠶

立齋方無穿

山甲而以猪

蹄汁一碗酒

一杯煎服其

用龍骨與氣

滯何居意以

通中用寒也

取義而已

湧泉三方俱

有奇藥而此

以穿山僵蠶

皂角通塞明

桃芝麻生乳

若肉豆蔻者

其善溫胃化

食者歟可與

智者生巧

右為乳無汁

須以補氣血

穿山甲

火炮黃色各等分一方無此味

右為末每服四錢用猪懸蹄煮汁調下

羅氏湧泉散 治氣滯少乳

瞿麥穗

麥門冬去心

王不留行

龍骨

穿山甲

炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪懸蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服忌食薑椒辛辣之物

湧泉散

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麵包煨熟各四錢

皂角

五錢

胡桃仁

去皮四兩

芝麻

炒半

右為細末每服不拘多少溫酒調下任意飲之

產寶方

治產後乳無

土瓜根桂心
通血脈有冷
白刺草以水八升煎取二升分溫三服
一方加桂心直為末

為主而此以
土瓜根桂心
通血脉有冷
熱不同全無
氣血之劑而
甘草一味又
超於法外矣

土瓜根

漏蘆

各三兩

通草

四兩

甘草

二兩

右剉碎以水八升煎取二升分溫三服○一方加桂心並為末酒服方寸匕

胡桃散治婦人少乳及乳汁不行

核桃仁

去皮十箇搗爛

穿山甲

為末一錢

右搗和一處黃酒調服

皂角散治乳汁不通及乳結硬疼痛

皂角

燒粉

蛤粉

右為末每服二錢熱酒調服○歌曰婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一杯調八字須臾核散笑呵呵

張氏方滋益氣脉榮衛行津液

葵子

炒香

縮砂仁

各等分

右爲細末。每服二錢。熱酒調下。

雜方 下乳汁。

枯蘘子洗淨。炒令香熟。瓦土搗令白色爲末。酒調下一錢。合

面臥少時再服。

一方。瓜蔓二枚。熟搗以白酒一斗。煮取四升。去滓溫飲。一升日三

一方。土瓜根爲末。酒調下一錢。日三服。

一方。京三稜三箇。水二碗。煮取一碗。洗之。取汁下爲度妙。

一方。穿山甲洗淨一兩。灰炒燥爲細末。酒調服方寸匕。治產乳無

汁。亦治乳結癰腫。

○已上治乳滯不行之劑。

以洗法通氣
又是一法

然會其理則

當歸

川芎

白芍藥酒

生地黃

木通

已下皆補法而諸法不同然會其理則各臻至妙通試法尤為入門便訣按第一方以四物不用熟地第二方合四君而無白水更去生地第三方有黃芪或歸或苁或甘草以至梗糯米羊蹄鍾乳種種變更皆不出於至中至正之道噫其能復超於法外否

加味四物湯 治氣血虛乳汁不通

當歸

川芎

白芍藥

酒炒

生地黃

木通

王不留行

天花粉

各三分

右剉一劑同獐猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將茹蕩

類洗乳房

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澁滯

此藥涼膈壓熱下乳

人參

白茯苓

當歸

各五分

芍藥

川芎

桔梗

炒

白芷

各一錢

甘草

五分

右咬咀水煎食後服如熱甚大便秘加大黃炒三分

富歸補血加葱白湯 治產後無乳

此方亦從補
法來而以葱
白引入乳房
尤為捷徑

當歸二錢

黃蓍一兩

葱白十根

右剉水煎服

通脈散 治女人乳少

當歸

天花粉

木通

牡蠣

穿山甲

右為細末用猪蹄湯入酒少許調服

通乳湯

治乳後氣血不足經血衰弱乳汁澁少

猪蹄四隻

通草二兩

川芎一兩

穿山甲

十四片炒黃

甘草一錢

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夜卧不宜失蓋更以葱湯頻洗乳房

一方治乳汁不通

當歸

穿山甲

酥炙各五錢

天花粉

王不留行

右為細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

甘草 各三錢

右為細末。每服三錢。猪蹄湯。或熱酒調下。其乳即通。

猪蹄湯。治妳婦氣少力衰。脉澁不行。絕乳汁。

猪蹄 一隻 通草 兩

右將猪蹄淨洗。依食治法。次用水一斗。同通草浸煮。得四五升。

取汁飲之。未作二料。

立効散。下乳汁。

粳米 糯米 各半 蒿苳子 一合並 生甘草 兩

右研細。用水二升。煎取一升。去淨。分三服。立下。

又方。治乳汁少。

瓜蒌根 薄荷幹身 各等分

陰以穀氣為主。即糯米。又為養陰。助乳之大藥也。

羊肉補形
荷葱絲和味
引經通滯

右為麤末。先喫羊蹄汁一碗。次服藥。後再喫葱絲羊羹湯。少許立効。

鍾乳散。治乳婦氣少血衰。脉澁不行。乳汁絕少。成鍊鍾乳粉。研細濃煎。漏蘆湯調下二錢。

雜方。有人乳汁不行。已十七日。諸藥無効。遇有人送赤豆一斗。遂時常煮粥食之。當夜乳脉通行。

一。方。麥門冬不拘多少。去心焙為末。以酒磨犀角約一錢許。煖調二錢服之。不過兩服。乳汁便下。

○已上治乳少不行之劑。

○乳汁自出。

當觀人勇法。天全云。產後乳汁自出者。乃是胃氣虛所致。宜服補藥以止之。若

此清心法可
為焦勞者一
助云乃又超
于法外矣

吸乳汁濃候

有湧漏故也

登且以扁鵲風散亦可

當觀人更法
以論虛實為
有瀉溢故也

予曾診一內
氣盛脈旺患
乳泣其生子
長而遊庠其
不育之說亦
未必盡然也

乳多溢滿急痛者溫帛熨之產寶有是論却無方以治之若有此
證但以漏蘆散亦可

有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及

薛氏曰前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散

肝經怒火用四物柴梔芩連肝脾鬱怒用加味歸脾湯

一產婦勞役忽乳汁如湧昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參

湯而甦更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹

或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗

散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

漏蘆散方見前

免懷湯欲摘乳者用此方通其月經則乳汁不行

當歸尾

芍藥

紅花酒

牛膝

酒浸各五錢

右剉水煎服。

一方。治婦人血氣方盛。乳房作脹。或無兒食乳。要消者。服此立消。

麥芽二兩。炒熟水煎服。○一方炒爲末。煎四物湯調服。卽止。

吹乳癰腫。

大全云。產後吹妳者。因兒喫妳之次。忽自睡着。爲兒口氣所吹。令乳汁不通。蓄積在內。遂成腫硬。壅閉乳道。傷結疼痛。亦有不疼。不痛。腫硬如石者。總名曰吹妳。若不急治。腫甚成癰。逮有至死者。連服皂角散。括蘂散。傳以天南星散。更以手揉之。則散。

薛氏曰。前證用藥。切不可損其氣血。

薛氏曰前證用藥切不可損其氣血

立方有法用藥有訣不可不達

丹溪云乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養或爲忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之熱沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而腫熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散矣此不治必成癰癰治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱以細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自衛便妄用鍼刀引惹拙病良可哀憫李氏曰婦人之乳男子之腎皆性命根也

初起煩渴嘔吐者膽胃風熱也甚則毒氣上衝咽膈妨碍寒熱者

肝邪也。此皆表證。宜不換金正氣散。加天花粉。能止渴嘔。定寒熱。咽隔有碍者。甘桔湯加生薑。或護心散。如潰後見此四證。爲虛。飲食厚味。忿怒憂鬱。以致胃火上蒸。乳房乳汁化爲濁濃。肝經氣滯。乳頭竅塞不通。致令結核不散。痛不可忍。初起便宜隔蒜灸。法切忌鍼刀能飲者。一醉膏加芎歸各一分。一服兩服卽効。不能飲者。瓜蒌散。

結核亦有因氣血虛弱。被外感內傷。以致痰瘀凝滯而成核者。俱以芷貝散爲主。血虛合四物湯。更加參朮柴胡升麻。氣虛合四君子湯。更加芎歸柴胡升麻。憂思傷脾者。歸脾湯加瓜蒌根貝母白芷連翹甘草節水酒各半煎服。有肝火結核腫痛甚者。清肝解鬱湯。

不散作痛。初起須忍痛。揉令稍軟。吸令汁透。自可消散。不效宜

有肝火結核腫痛甚者清肝解毒湯

吹乳因乳子膈上有痰口氣熾熱含乳而睡熱氣吹入乳房凝滯不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸令汁透自可消散不散宜益元散冷薑湯或井水調一日一夜服三五十次自解重者解毒湯頓服之挾氣者正貝散單青皮湯外用漏蘆爲末水調敷之又有乳汁不行外乳脹痛者湧泉散

核久內脹作痛外腫堅硬手足不近謂之乳癰未潰者仍服瓜蔓散內托升麻湯或復元通氣散加漏蘆虛者托裏消毒散將潰兩乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯哺熱內熱者八物湯加五味子胃虛嘔者六君子湯加香附砂仁胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾薑藿香遇勞腫痛者八物湯倍參耆歸木遇怒腫痛者八物湯加

山梔。

王損菴曰。隆慶庚午。予自秋闈歸。則亡妹已病。蓋自七月乳腫痛。不散。八月用火鍼取膿。醫以十全大補湯。與之外敷鐵符散。不效。反加喘悶。九月產一女。潰勢益大。而乳房爛盡。廼及胸腋濃水稠粘。出膿幾六七升。略無効勢。十一月始歸就醫。改用解毒和平中劑。外搽生肌散。龍骨寒水石等劑。膿出不止。流踐所及。卽腫泡潰膿。兩傍紫黑。瘡口十數。胸前腋下皆腫潰。不可動側。其勢可畏。余謂產後毒氣乘虛而熾。宜多服黃耆解毒補血。益氣生肌。而醫不敢用。十二月中旬。後益甚。瘡口念餘。諸藥及試不効。始改用予藥。時膿穢粘滯。煎楮葉猪蹄湯沃之。頓爽。乃治一方。名黃耆托裏湯。黃耆之甘溫。以排膿益氣。生肌爲君。甘草補胃氣解毒。當歸身和

黃蓍之甘溫以排膿益氣生肌爲君。甘草補胃氣解毒。當歸身。補

血。生血爲臣。升麻。葛根。漏蘆。爲足陽明本經藥。及連翹。防風。皆散
結疎經。瓜。薤。仁。鼠。粘。子。解毒去腫。皂角刺。引至潰處。白芷。入陽明。
排膿長肌。又用川芎三分。及肉桂炒藥爲引用。每劑入酒一盞。煎
送白玉霜丸。疎膿解毒。時膿水稠粘。方盛未已。不可還用收澁之
藥。理宜追之。以翠青錠子外搽。明日膿水頓稀。痛定穢解。始有向
安之勢。至辛未新正。患處皆生新肉。有紫腫處。俱用葱熨法。隨手
消散。但近腋足少陽分。尚未斂。乃加柴胡一錢。青皮三分。及倍川
芎。膿水將淨者。卽用搜膿散。搽之。元宵後遂全安。

康祖爲廣德宰。事張王甚謹。後授溫倅。左乳生癰。繼又胸臆間結
核。大如拳。堅如石。荏苒半載。百療莫効。已而牽掣臂腋。徹於肩。痛
楚特甚。急禱王祠下。夢聞語曰。若要安。但用生薑自然汁。製香附

服之。覺呼其子檢。本草視之二物。治證相符。訪醫者亦云。有理遂用香附子去毛。薑汁浸一宿為末。二錢米飲調。方數服。瘡膿流出。腫硬漸消。自是獲愈。

一婦人稟實性躁。懷抱久鬱。左乳內結一核。按之微痛。以連翹飲子二十餘劑。少退。更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑。而消。

消毒飲。治吹乳吹癰。并便毒。如增寒壯熱。或頭痛者。先服人參

敗毒散一二劑。方可服此藥。如無前證。即服此二三劑。或腫不

消。宜服托裏藥。

當歸 白芷 青皮去白 貝母 柴胡

天花粉 僵蠶炒 金銀花各三錢

白芷為陽明經排膿止痛。青皮柴胡行厥陰經氣滯。當歸行血。天花粉通血脈。僵蠶散結痰。貝母開鬱痰。金銀花味甘。

加大黃以治便毒。亦行連翹飲。

治乳癰。

見母開解其

天花粉

疆蠶炒

金銀花冬三

總解諸毒其
加大黃以治
便毒者亦行
厥陰汚濁之
血也
此專行厥陰
氣血凝滯之
藥

以凝注不散
故用天花角
刺山甲歸尾

以乳房結核

劉一劑水煎服○便毒加大黃煨一錢空心服

連翹飲子 治乳癰

連翹結熱 瓜蔓仁降痰緩用 川芎血 皂莢刺 橘葉氣

青皮氣 甘草節血 桃仁各二錢血

右作一服水煎食遠服○如已破者加麥蘖當歸未破者加柴

胡升麻

一方 治血脉凝注不散結成吹乳乳癰痛腫不可忍者

天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 當歸尾

白芷稍 瓜蔓仁 貝母去心 甘草節

右劉酒煎服

又方 治婦人乳中結核

平合圖目

卷十四吹乳癰腫

三

故用升麻青皮而連翹散結熱甘節瓜萸緩肝潤燥也

治黑陷妙劑而黃蘗之用所以治陷也肉桂之用所以發毒也

風熱即肝熱

生風言熱則

火在其中矣

治以道遠散

加山枝四物

養肝血清胆

熱也治熱即

治風養血即

升麻

連翹

青皮

甘草節各二錢

瓜萸仁三錢

右作一服水煎食後細細呷之

內托升麻湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼並乳癰

初起亦治

升麻

當歸身

葛根

連翹

黃蘗各二錢

黃耆三錢

牛蒡子

甘草炙各一錢肉桂五分

右作一服水一鍾酒半鍾煎食後服

清肝解鬱湯

治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳內結核或

為腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之證宜用此藥

人參去蘆

茯苓

熟地黃

芍藥炒

貝母去心

山梔炒

白木各一錢

當歸各五分

柴胡

虛者不宜輕

右水煎服

此方重破字上

山坭炒絡白木

當歸各一錢

柴胡

同白米非氣虛者不宜輕用

此方重在破字上

牡丹皮 川芎 右水煎服

陳皮 各八分 甘草 五分

一方 乳栗破則少有生者必大補或庶幾耳

人參 黃耆 白朮 當歸 川芎

連翹 白芍 甘草節

右剉水煎服 一方有青皮瓜蒌無白朮 乳岩小破加柴胡

一方 治乳硬痛

當歸 甘草 各三錢 沒藥 二錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

金銀花散 治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花 當歸 黃耆 蜜 甘草 各二錢半

以乳脉不行而用黃芪宜詳之

破二字亦一竅也 硬字上討好

黃藥子解熱毒要藥而所配諸藥又極當是丹溪論中語也

石膏青皮是一陰行而配法差別

在核字上看

右作一服水煎入酒半鍾食後溫服

丹溪方治乳腫痛

青皮 石膏煨 連翹 皂角刺炒 黃藥子

當歸頭 木通各一錢 生甘草三分

右作一帖水煎入好酒些少同煎服

一方治乳癰妳勞癰腫

石膏煨 樺葉燒 瓜蒌子 青皮 甘草節

右剉水煎服

一方治乳有核

南星 貝母 甘草節 瓜蒌各一兩 連翹半兩

右以水煎入酒服

通氣二二如 木香 茴香 青皮 穿山甲 酥 陳皮

右以水煎入酒服。

通氣三字妙。

復元通氣散。治婦人乳癰及一切腫毒。

木香 茴香 青皮 穿山甲 酥 陳皮

白芷 甘草 漏蘆 貝母去心姜製各等分

右為細末。每服三錢。好酒調下。

治乳癰方。

行結氣結血。其加參基文。是一法。

青皮 瓜蒌子 橘葉 連翹 桃仁尖留

皂角刺 甘草節

右水煎服。如破多加參耆。

神効瓜蒌散。治婦人乳癰。乳岩神効。

此用乳沒法始。

黃瓜蒌子多者不去皮焙乾研爛 當歸酒洗 生甘草各五錢

沒藥各另研一錢半

乳香

右作一劑用好酒三碗於磁石器中慢火熬至碗半分爲三次食後服如有乳岩便服此藥可杜絕病根如毒氣已成能化膿爲黃水毒未成則內消疾甚者再合一服以愈爲度○立効散與此間服神効但於瓜蔓散方減去當歸加紫色皂角刺一兩六錢是也

冤源五物湯

治癰疽發背乳癰通用

括蕒

炒一校

皂角刺

半燒帶生

沒藥

各半兩

乳香

甘草

各半兩

右剉用醇酒三升煎取二升時時飲之痛不可忍立止

括蕒散

治吹乳

乳香

一錢研

括蕒

一個一方用根一兩

右剉用酒煎服或爲末溫酒服二錢外用南星末溫湯調塗

痰神驗因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之

右劉用酒煎服。或為末。溫酒服二錢。外用南星末。溫湯調塗。

橘香散。治乳癰未結。即散。已結。即潰。極痛不可忍者。樂了即不

疼。神驗。因小兒吹乳。變成斯疾者。並皆治之。

陳皮去白乾麩炒 麝香一分
黃為末一兩

右研勻。酒調下二錢。被益汗出。即愈。

補遺方。治吹乳結實腫痛。

陳皮亦厥陰藥。

陳皮二兩 甘草一錢

右剉水煎。分兩次服。用荊芥羌活獨活煎湯熏洗。即散。

一方。治乳癰。

夜明砂 瓜蒌炒 阿魏

右為末。飯丸。酒吞下。

通和湯。治婦人乳癰。疼痛不可忍者。

此方無分兩。大都以夜明砂為君。以破結血也。瓜蒌為臣。以潤結痰也。阿魏為佐。軟堅破滯。

也。
自然銅其通
壅滯者歟。

穿山甲

炮黃

木通

各兩

自然銅

半兩醋
滓七次

右為末

每服二錢

熱酒調下

食遠服

二灰散

治產後乳汁不泄

結滯不消

熱毒

蔓荊子

燒

皂角刺

燒各
等分

右為末

每服二錢

溫酒調下

無時

夜陰散

治吹乳乳癰

蜘蛛

三箇

紅棗

三枚
去核

右每棗一枚

入蜘蛛一箇

夾於內

炒熟

口嚼

喫用

燒酒送下

未

成者

立消

已成者

立潰

獨勝散

治婦人吹奶

初覺身熱

頭疼

寒熱及

胸乳腫硬

是其候

也

服之

能令下乳

汁通血脉

立能自消

也

服之

能令下乳

汁通血脉

立能自消

也

服之

能令下乳

汁通血脉

立能自消

也

服之

右為末

每服二錢

酒調服

腫硬立消

甚者

不過三服

也

服之

能令下乳

汁通血脉

立能自消

也

也服之能令下乳汁通血脈立能自消

白丁香 真者

右為末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

一方治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者服之良驗

此藥行厥陰經

鹿角一兩炭火煨存性研細分作二服先將末藥五錢入鍋次下無灰酒一碗滾數沸倒在碗內乘熱盡飲卧服汗出即安

磨者更妙

一方用鹿角剉為細末酒調二三錢服亦効

一方用鹿角於麤石上磨取白汁塗之乾又塗

勝金丹 治吹乳結核不散腫痛者神効亦治乳岩

百齒霜

即梳齒上頭垢

右用無根水。丸如雞頭子大。以黃丹為衣。每服一九。或二九好酒下。如不飲酒。白湯下。不可化開。亦不可令病人知。極有效驗。

一方。治乳癰及無名腫毒初起。

用五葉藤一名五龍爪。不拘多少。生薑一塊。好酒一碗。搗爛去渣。熱服。汗出為度。仍以渣敷。

破血破氣破
敷乳方

痰

天南星 皂角刺燒帶生 半夏生各三分 白芷 草烏

直疆蠶焙各一分

葱與蜜反故用之

右為細末。多用葱白研取汁。入蜜調敷。若破瘡口。用膏藥貼。葱熨法。治吹乳乳癰。登時立消。

通陽明壅結。用連根葱一大把。搗爛成餅。一指厚。攤乳上用。銅罐盛灰火。

治吹乳

用連根葱一大把搗爛成餅一指厚攤乳上用銅確盛灰火

覆葱上須臾汗出即愈

一方治吹妳

金銀花 天蕎麥 紫葛藤 各等分

右以醋煎洗患處立消如無蕎麥葛藤二味只金銀花亦可

一方治乳癰

大黃 鼠糞 新者各一分 黃連二分

右三味搗為末以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟

米粳米亦得

柳根熨法治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青

用柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛著練囊中熨乳上乾則

易之一宿即愈

前敷藥宜溫熱此以清涼而氣血之分甚有別也

雜方 治吹乳乳癰。

用新栢葉一握洗淨以朴硝一勾同入臼內杵之旋加清水
組取自然汁半碗先以病人飲三兩口仍用鷄翎蘸汁掃於
患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消。

一方用生地黃搗汁塗之一日三五次立効。

一方用生山藥搗爛敷上即消消即去之遲則肉腐。

一方採嫩桑葉研細米飲調攤紙花貼患處。

一方用蒲公英搗爛會患處神妙。

一方用天南星爲末以溫酒調塗。

一方以益母草爲末調塗或生搗爛用之。

一方治吹乳用桑樹蛙屑飯搗成膏貼之。

一方用野椒桑和藥一同搗膏敷患處。

一方治吹乳用桑樹蛀屑飯搗成膏貼之

一方用遠志酒煎服。滓傳患處。

一方用野椒桑和藥。一同搗膏。敷患處。

一方用鼠粘子。加射干。酒吞下。

一方治乳癰。用人牙齒燒存性。研為細末。以酥調塗貼癰上。

一方治吹乳初覺。用白紙一小塊。寫山田火三字。如左乳患。躍於右鞋底。右乳患。躍於左鞋底。神效。忌金石揉熨。

一方治乳癰初發。用貝母為末。每服二錢。溫酒調下。即以兩手覆按於桌上。垂乳良久自通。

一方用真樺皮為末。酒服。方寸匕。睡醒已失。

一方用蒲公英忍冬藤。酒煎服。即欲睡。是其効也。

一方單用蒲公英煮汁。飲及封之立消。

一方治吹乳用猪牙皂角去皮。弦蜜炙爲末。酒調服之。

一方用大車頭邊油垢。丸如桐子大。每服五十丸。溫酒下。

一方螞蟥去足。用蓋燒存性爲末。每服二錢。黃酒下。

一方用黍子一合。黃酒下卽散。

一方治吹乳未成膿者。用鼠糞二十一粒。研爲細末。冷水調服。立効。

○妬乳

夫妬乳者。由新產後兒未能飲。致乳不洩。或乳脹捏其汁不盡。皆令乳汁蓄結。與血氣相搏。卽壯熱大渴。引飲牢強。掣痛。手不得近是也。初覺便知。以手捏去汁。更令傍人助吮。引之不爾。或作瘡有膿。其熱勢盛。必成癰也。輕則爲吹乳妬乳。重則爲癰。雖有專門。不可不知。

可不知

浸淫瘡亦名妬乳

缺漏若散

有餘者瀉之也

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡瘻之黃汁出浸淫漸長百療不差動經年月名為妬乳宜以赤龍皮湯天麻湯洗之傳二物湯飛鳥膏及飛鳥散始作者可傳以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並進連翹散治產後妬乳并癰實者下之

連翹 升麻 玄參 芍藥 白欬 防風 射干

杏仁 芒硝 大黃 甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

瓜蒌散治乳初結脹不消令敗乳自返

瓜蒌一個半粉草一寸半生薑一塊半

右剉用酒二碗煎服少頃痛不可忍即搜去敗乳臨臥再一服

順所患處乳側臥於床上令其藥行故也無生薑用麥芽

一方 治乳妬

黃芩 白鯁 芍藥

右爲末。以漿水飲服半錢。七日三。若左乳汁結者。卽得去左乳。

將法有見解

赤龍皮湯 治妬乳

櫛皮三升。水一斗。煮五升。夏冷洗。秋冬溫之。分以洗乳。

天麻湯 治妬乳。亦洗浸淫。黃爛熱瘡。痒疽濕陰。蝕瘡。小兒頭瘡。

天麻草五升。以水一斗半。煎取一斗。隨寒溫分洗乳。以殺痒。

也。洗畢傳膏散。

飛鳥散 治乳頭生瘡。及諸熱浸淫。丈夫陰蝕。痒濕。小兒頭瘡。瘡。

蝕等瘡。並以此傳之。

卽益母

餌等瘡並以此傳之

維粉燒硃砂作水銀上黑 枯礬二兩燒粉

右二味篩為細末以油煎和之令如脂以搗乳瘡口三有汁可

乾搽

黃連用分膏治乳瘡並諸濕痒黃爛肥瘡

黃連二兩為末 胡粉二兩半 水銀一兩同研令消散

右三味相和皮裏熟煖之自和合也縱不成一家且得水銀細

散入粉中以傳乳瘡

一方治妬乳生瘡

蜂房 猪甲中土 車轍中土各等分

右二味為末苦酒和傳之

鹿角散治婦人乳頭生瘡汁出疼痛欲死不可忍者

鹿角

三分

甘草

一分

石二味爲末。和以鷄子黃。於銅器中置溫處。炙上。傳之。日再卽愈。神驗。不傳。

雜方

治妬乳乳癰。

燒自死蛇爲灰。和以猪膏塗之大良。

一方葵莖及子搗篩爲末。酒服方寸匕。卽愈。

一方鷄屎乾爲末。酒服方寸匕。須臾三服愈。

一方馬溺塗之立愈。

一方取搗米槌二枚。炙令熱。以絮及故帛搗乳上。以槌更互熨之。瘡止。已用立効。

一方皂角十條。以酒一升。揉取汁。硝石半兩。煎成膏。傳之。

一方用赤小豆。酒研爛。溫服。滓封患處。

一方皂角十條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傳之

一方蔓荊子搗爛酒服仍以滓敷患處

一方用赤小豆酒研爛溫服滓封患處

一方仙人掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊同研爛入桂末少

許炒酒服滓登患處

一方治乳頭裂破

用丁香爲末傳之○一方用秋茄子裂開者陰乾燒存性水

調塗之

補遺方治婦人乳頭小淺瘡爛痒

用芙蓉花或葉乾爲末搽之

○乳巖

○丹溪云婦人不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣

消沮。肝氣橫逆遂成隱核。如繫棋子。不痛不痒。十數年後。方爲瘡。陷名曰乳巖。以其痛形嵌凹。似巖穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心情神安。然後施之治法。亦有可安之理。予族侄婦年十八歲。時曾得此詔。審其形。脉稍實。但性急躁。伉儷自偕。所難者。從姑耳。遂以單方青皮湯。間以加減四物湯。行經絡之劑。兩月而安。

經通肝氣能
散經止則血
枯矣

此病多因厚味。濕熱之痰。停蓄膈間。與滯乳相搏而成。又有滯乳。因見口氣吹噓而成。又有拘怒氣。激滯而生者。煨石膏。燒樺皮。瓜。蒺子。甘草節。青皮。皆神効藥也。婦人此病。若早治之。便可立消。有月經時。悉是輕病。五六十後。無月經時。不可作輕易看也。一婦年六十。厚味鬱氣。而形實多姪。夏無汗。而性急。忽左乳結一。

惜哉

小核大如棋子。不痛。自覺神思不佳。不知食味。纔半月。以人參調青皮甘草。未入生薑汁。細細呷。一日夜五六次。至五七日消矣。此乃妬岩之始。不早治。隱至五年十年已後。發不痛不痒。必如乳下潰一竅。如巖穴出膿。又或五七年十年。雖飲食如故。洞見五內。乃死。惟不得於夫者有之。婦人以夫爲天。失於所天。乃能生此。此謂之巖者。以其如穴之嵌呀空洞。而外無所見。故名曰巖。患此者。必經久淹延。惟此婦治之早。正消患於未形餘者。皆歿。凡十餘人。又治一初嫁之婦。只以青皮甘草與之安。

龔氏曰。婦人乳岩。始有核腫。如繫棋子。大。不痛不痒。五七年方成瘡。初便宜多服疎氣行血之藥。須情思如意。則可愈。如成瘡之後。則如岩穴之凹。或如人口有唇。赤汁膿水浸淫胸腹。氣攻疼痛。

用五灰膏去蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終不可治宜服十六味流氣飲

薛氏曰乳岩乃七情所傷肝經血氣枯槁之證大抵鬱悶則脾氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治惟一婦服益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更以木香餅炙之喜其謹疾年餘而消餘不信乃服剋伐行氣之劑如流氣飲敗毒散反大如覆碗自出清膿不飲而歿

李氏曰有鬱怒傷肝脾結核如蟹棋子大不痛不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖滴盡氣血方死急用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

飲及卑青皮湯兼服。虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

有如是之神鼻二宿而消

青皮散。治乳巖初起如蟹棋子不痛不痒須趁早服之免致年

久潰爛

青皮 甘草

右為末用人參煎湯入生薑汁調細細呷之一日夜五六次至消乃已。○年少婦人只用白湯調下

十六味流氣飲。治乳岩

當歸 川芎 白芍藥 黃耆 人參 官桂

乳岩之病大都生於鬱氣。其用主怒其性條達鬱而不舒則曲其挺然之質乳頭屬厥陰經其氣與痰時為積果故成結核茲以風

東子下。令病人曲身低頭。將口鼻及病乳。常吸烟氣。未甚縮。再用一料。則瘀血消。而乳頭自復矣。若更不復舊。用革麻子搗爛。貼頂上。片時收。卽洗去。

濟陰綱目卷之十四

終

